

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 19 5 67 848772

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 86-31-55 - 86-32-55)

Abonnement Annuel

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRÉNÉES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Boîte Postale n° 20 — 31-BALMA
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

- Supplément n° 1 au bulletin n° 80

1967 - 11

- A V E R T I S S E M E N T S -

VIGNE

. Vers de la grappe (Cochylis et eudémis) :

La circulation des adultes des deux espèces est en cours depuis 3 semaines tandis que des pontes se sont produites dès le début du vol.

Après une durée d'incubation longue en ce qui concerne les premiers oeufs déposés, on assiste actuellement aux premières éclosions de jeunes chenilles des deux espèces. En raison de l'élévation sensible de la température, la durée d'incubation va se réduire et les naissances se regrouper dans les jours à venir.

En conséquence, un premier traitement devrait être appliqué dès les premiers jours de la semaine du 15 au 21 avec un produit de "type préventif". Si l'on préfère employer un produit de "type curatif", attendre une semaine supplémentaire pour intervenir.

. Mildiou :

Dans les secteurs abondamment arrosés lors des pluies tombées du 1er au 5 mai, en particulier dans le vignoble du Tarn et du Lot, quelques foyers primaires ont pu se former. Dans ces lieux notamment, il est conseillé de surveiller attentivement les vignes et surtout de supprimer le plus rapidement possible et avant le 15 mai toutes les repousses inutiles de la base des souches.

ARBRES FRUITIERS

. Tavelures du poirier et du pommier :

Alors que les périthèces ne sont pas encore complètement vides, de nouvelles taches risquent d'apparaître entre le 15 et le 20.

En conséquence, il serait prudent de prévoir un nouveau traitement à mettre en place en cas de menace de pluie.

- I N F O R M A T I O N S -

ARBRES FRUITIERS

. Oïdium du pommier :

Supprimer les pousses oïdiées et poursuivre la protection à l'occasion des traitements dirigés contre la tavelure.

P. J. A. 91

• Pucerons :

Ces insectes sont actuellement très actifs et leurs colonies se développent vigoureusement. Surveiller les vergers et intervenir, le cas échéant.

• Rouille du prunier et Carnocapse des prunes :

Il y a lieu de prévoir dès à présent une application d'une bouillie mixte composée d'un ester phosphorique et d'un fongicide à base soit de Zinèbe, soit de Ziram.

CULTURES LEGUMIERES

• Teigne du poireau :

Les éclosions de chenilles se sont très échelonnées et on les trouve encore à tous les stades de développement alors que les premières nymphoses se sont déjà produites. Des dégâts sont en cours non seulement sur poireau mais aussi sur ail et sur oignon parfois.

Traiter dès que possible si cela n'a pas encore été fait (voir bulletin du 24 avril 1967).

BALMA, le 11 mai 1967

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX